



ORTHO FLEXTECH®
DENTAL RETENTION SYSTEM

INSTRUCTIONS FOR USE



RELIANCE®

ORTHODONTIC
PRODUCTS

RELIANCEORTHODONTICS.COM

V21.3.20 2797



EN ENGLISH TRANSLATION

INDICATIONS FOR USE: Intended for use as a Lingual Retainer Wire. This product is not indicated for individuals with sensitivity to Nickel.

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Prophy and sandblast the enamel, rinse and dry. Etch the enamel for 30 seconds. Rinse and Dry.
2. Apply one coat of Assure® Plus to the etched enamel. Lightly air dry.
3. Apply a minimal amount of L.C.R.™ GoTo™ or FlowTain™ to the lingual surface of each tooth.
 - Place the Ortho FlexTech® chain in the applied adhesive ("undercoat") on the lingual surface. Position for best alignment and take up any slack in the chain.
 - Alternate Method: Place one end of Ortho FlexTech® chain in the applied adhesive paste ("undercoat") on the lingual cuspid surface. Position for best alignment and light cure to hold chain in place. Proceed to the next tooth, taking up any slack in the chain. Repeat this process until the opposing cuspid has been reached.
4. Place an "overcoat" of L.C.R.™ GoTo™ or FlowTain™ paste on top of the cured material to cover the Ortho FlexTech™ chain. Light cure the "overcoat" paste on each bonded tooth.
5. Check for interference between upper and lower. Polish any rough spots or high points carefully.

NOTE: If used on upper to hold diastema, consider secondary .0175 twist 1 to 1 or Retainium™, as the chain can stretch slightly allowing space to reopen.

Do not Re-Use. This is a single use device

REORDER NUMBERS: REF# OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", REF# OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

WARRANTY: Reliance Orthodontics Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept

liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

BG BULGARIAN TRANSLATION

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Предназначена за използване като лингвала фиксираща жица. Този продукт не е показан за лица с чувствителност към никел.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Обработете емайла с пясъчна струя, изплакнете и подсушете. Извършете ецване на емайла за 30 секунди. Изплакнете и подсушете.
2. Нанесете един слой от Assure ® Plus върху подложния на ецване еайл. Подсушете леко с въздух.
3. Нанесете минимално количество L.C.R.™ GoTo™ или FlowTain™ върху лингвалната повърхност на всеки зъб.
 - Поставете веригата Ortho FlexTech® в нанесеното лепило („grund“) върху лингвалната повърхност. Позиционирайте за най-добро подравняване и поемане на всяко провисване на веригата.
 - Алтернативен метод: Поставете единия край на веригата Ortho FlexTech® в нанесената адхезивна паста („grund“) върху лингвалната повърхност на кучешките зъби. Позиционирайте за най-добро подравняване и леко втвърдете, за да се държи веригата на място. Пристъпете към следващия зъб, поемайки всяко провисване на веригата. Повтаряйте този процес, докато не стигнете до противоположния кучешки зъб.
4. Нанесете „grund“ от L.C.R.™ GoTo™ или паста FlowTain ™ върху втвърдения материал, за да покриете веригата Ortho FlexTech™. Леко втвърдете „грундираща“ паста върху всеки свързан зъб.
5. Проверете за взаимодействие между горната и долната част. Полирайте внимателно всички грапави петна или високи точки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се използва в горната част за задържане на диастема, обмислете вторично .0175 усукване 1 към 1 или Retainium™, тъй като веригата може да се разтегне леко, което позволява на пространството да се отвори отново.

Не използвайте повторно. Това е устройство за еднократна употреба.

НОМЕРА ЗА ПОВТОРНА ПОРЪЧКА: РЕФ. № OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", РЕФ.

№ SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", PEФ. № OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", PEФ. № SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

CS CZECH TRANSLATION

INDIKACE K POUŽITÍ: Určeno pro použití jako drát lingválního držáku. Tento produkt není určen pro osoby s citlivostí na nikl.

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Sklovínu profylakčně ošetřete a otruskejte, opláchněte a osušte. Leptejte sklovínu po dobu 30 sekund. Opláchněte a osušte.
- Naneste jednu vrstvu Assure® Plus na leptanou sklovínu. Lehce osušte vzduchem.
- Naneste minimální množství L.C.R.™ GoTo™ nebo FlowTain na lingvální povrch každého zuba.
- Umístěte řetěz Ortho FlexTech ® do naneseného adheziva („spodní nátěr“) na lingvální povrch. Umístěte pro nejlepší zarovnání a vyronejte jakoukoli vůli v řetězu.
- Alternativní metoda: Jeden konec řetězu Ortho FlexTech® vložte do nanesené adhezivní pasty („spodní nátěr“) na lingvální povrch špičáku. Umístěte pro nejlepší zarovnání a polymerujte světlem, aby řetěz držel na místě. Pokračujte k dalšímu zubu a odstraňte jakoukoli vůli v řetězci. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete protilehlého špičáku.
- Na horní stranu polymerovaného materiálu naneste „překryv“ pasty L.C.R.™ GoTo™ nebo FlowTain™, aby se zakryl řetěz Ortho FlexTech™. Polymerujte světlem „překryv“ pasty na každém bondovaném zubu.
- Zkontrolujte, zda nedochází k rušení mezi horní a dolní částí. Opatrně vyleštěte všechna drsná místa nebo vysoké body.

POZNÁMKA: Pokud se používá na horní část k udržení diastémy, zvažte sekundární zakroucení o 0,0175 1:1 nebo Retainium™, protože se řetěz může mírně protáhnout, což v

malé míře umožňuje opětovné otevření prostoru.

(2) Nepoužívejte opakováně. Toto je zařízení pro jedno použití

ČÍSLA OPAKOVANÉ OBJEDNÁVKY: REF# OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", REF# OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", REF# SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontics Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc neprjímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztrátu, příme nebo následné, vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

DA DANISH TRANSLATION

INDIKATIONER Beregnet til brug som et lingual tandbøjletråd. Dette produkt er ikke indiceret til personer overfølsom over for nikkel.

BRUGSANVISNING:

- Rens og sandblæs emaljen, skyl og tør. Æts emaljen i 30 sekunder. Skyl og tør.
- Påfør et lag Assure ® Plus på den ætsede emalje. Lufttør let.
- Påfør en minimal mængde L.C.R.™ GoTo™ eller FlowTain™ på den tinguale overflade af hver tand.
 - Placer Ortho FlexTech ® kæden i det påførte bindemiddel ("underlag") på den linguale overflade. Placer til bedste justering, og stram kæden hvis nødvendigt.
 - Alternativ metode: Placer den ene ende af Ortho FlexTech ® -kæden i den påførte adhesive pasta ("underlag") på den linguale hjørmetandsoverflade. Placer for den bedste justering og lyshærd for at holde kæden på plads. Fortsæt til næste tand og stram kæden hvis nødvendigt. Gentag denne proces, indtil den modsatte hjørnetand er næet.
- Placer et "overlag" af L.C.R.™ GoTo™ eller FlowTain™ -pasta oven på det hærdede materiale for at dække Ortho FlexTech™ -kæden. Lyshærd "overlags"-pastaen på hver bondede tand.
- Kontroller for interferens mellem øvre og nedre. Polér alle ru pletter eller høje punkter omhyggeligt.

BEMÆRK: Hvis det anvendes øverst til at holde diastema, skal du overveje sekundært

.0175-drejning 1 til 1 eller Retainium™, da kæden kan strække sig lidt, hvilket giver plads til genåbning.

② Må ikke genbruges. Dette er en enhed til engangsbrug

GENBESTILLINGNSNUMRE: REF# OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", REF# OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

GARANTI: Reliance Orthodontics Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsvigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Føderal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

DE GERMAN TRANSLATION

ANWENDUNGSHINWEISE: Vorgesehen zur Verwendung als Lingualretainer-Draht. Dieses Produkt ist für Personen mit einer Empfindlichkeit gegenüber Nickel nicht geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Reinigung und Sandstrahlen des Zahnschmelzes, Spülung und Trocknung. Ätzung des Schmelzes über 30 Sekunden. Spülung und Trocknung.
2. Eine Schicht Assure® Plus auf den geätzten Schmelz auftragen. Vorsichtig mit Luft verblasen.
3. Eine minimale Menge L.C.R.™, GoTo™ oder FlowTain™ auf die Lingualfläche jedes Zahnes auftragen.
 - Die Ortho FlexTech®-Kette in den aufgetragenen Kleber ("Grundierung") auf der Lingualfläche platzieren. Für optimale Ausrichtung positionieren und Schlupf in der Kette aufnehmen.
 - Alternative Methode: Ein Ende der Ortho FlexTech®-Kette in die aufgetragene Klebepaste ("Grundierung") auf der lingualen Eckzahnfläche platzieren. Für optimale Ausrichtung positionieren und mit Licht aushärten, um die Kette zu fixieren. Mit dem nächsten Zahn fortfahren und Schlupf in der Kette aufnehmen. Diesen Vorgang wiederholen, bis der gegenüberliegende Eckzahn erreicht ist.
4. Einen "Überzug" aus L.C.R.™, GoTo™ oder FlowTain™ auf das ausgehärtete Material legen, der die Ortho FlexTech™-Kette bedeckt. Die Paste für den "Überzug" auf jedem verklebten Zahn mit Licht aushärten.

5. Auf Behinderung zwischen Ober- und Unterteil prüfen. Alle rauen Stellen oder Glanzpunkte sorgfältig polieren.

HINWEIS: Bei Verwendung auf dem Oberteil zum Halten von Diastema sollte eine sekundäre 0,0175-Drehung 1:1 oder Retainium™ in Betracht gezogen werden, da sich die Kette leicht dehnen kann, so dass die Lücke sich wieder öffnen kann.

② Nicht wiederverwenden. Dies ist ein Einwegprodukt.

NUMMERN FÜR DIE NACHBESTELLUNG: REF# OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Edelstahl 30", REF# OFT#, Ortho FlexTech Gold geätzt, 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Edelstahl geätzt.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultierten bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

EL GREEK TRANSLATION

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προορίζεται για χρήση ως σύρμα γλωσσικού συγκρατητικού. Αυτό το προϊόν δεν ενδείκνυται για άπομα με ευαισθησία στο νικέλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Προφυλάξτε και καθαρίστε με αμμοβολή την αδαμαντίνη, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Αδροποιήστε την αδαμαντίνη για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
2. Εφαρμόστε μια στρώση Assure® Plus στην αδροποιημένη αδαμαντίνη. Στεγνώστε ελαφρά με αέρα.
3. Εφαρμόστε την ελαχίστη απαιτούμενη ποσότητα L.C.R.™ GoTo™ ή FlowTain™ στη γλωσσική επιφάνεια κάθε δοντού.
 - Τοποθετήστε την αλυσίδα Ortho FlexTech® στο συγκολλητικό που έχει εφαρμοστεί («υπόστρωμα») στη γλωσσική επιφάνεια. Τοποθετήστε κατάλληλα για να επιτευχθεί η βέλτιστη ευθυγράμμιση και τεντώστε την αλυσίδα εάν είναι χαλαρή.
 - Εναλλακτική μέθοδος: Τοποθετήστε το ένα άκρο της αλυσίδας Ortho FlexTech® στη συγκολλητική πάστα που έχει εφαρμοστεί («υπόστρωμα») στη γλωσσική

επιφάνεια στους κυνόδοντες. Τοποθετήστε κατάλληλα για να επιτευχθεί η βέλτιστη ευθυγράμμιση και φωτοπολυμερίστε για να συγκρατηθεί η αλυσίδα στη θέση της. Προχωρήστε στο επόμενο δόντη, τεντώντας την αλυσίδα εάν είναι χαλαρή. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσετε στον απέναντι κυνόδοντα.

- Τοποθετήστε μια «ανώτερη στρώση» L.C.R.™ GoTo™ ή πάστας FlowTain™ επάνω από το πολυμερισμένο υλικό για να καλύψετε την αλυσίδα Ortho FlexTech™. Φωτοπολυμερίστε την «ανώτερη στρώση» της πάστας σε κάθε δόντη που έχει συγκολληθεί.
- Ελέγχετε εάν υπάρχει εισώχηση μεταξύ των επάνω και των κάτω. Στιλβώστε προσεκτικά το ισοδιάποτε τραχιά ή προεξέχοντα προς τα επάνω σημεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται στην επάνω πλευρά για τη συγκράτηση του διαστήματος, εξετάστε να κάνετε μια δεύτερη περιστροφή 1 προς 1 κατά 0,0175 ή τη χρήση του Retainium™, καθώς η αλυσίδα μπορεί να τεντωθεί ελαφρώς, αφήνοντας χώρο για το εκ νέου άνοιγμα.

② Μην επαναχρησιμοποιείτε. Αυτή η συσκευή είναι μίας χρήσης

ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: Αριθμός αναφοράς OFT2, Ortho FlexTech Χρυσό 30", Αριθμός αναφοράς SSOFT, Ortho FlexTech από ανοξείδωτο αστάλι 30", Αριθμός αναφοράς OFT, Ortho FlexTech Χρυσό αδροποιημένο, 30" Αριθμός αναφοράς SSOFT, Ortho FlexTech από ανοξείδωτο αστάλι αδροποιημένο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: H Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. H Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σε σχέση με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντιάτρου.

ES SPANISH TRANSLATION

INDICACIONES DE USO: Diseñado para el uso como alambre de retención lingual. Este producto no está indicado para personas con sensibilidad al níquel.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Realice la profilaxis y arene el esmalte, enjuague y seque. Grabe el esmalte durante 30 segundos. Enjuague y seque.
- Aplique una capa de Assure® Plus al esmalte grabado. Seque ligeramente con aire.

3. Aplique una cantidad mínima de L.C.R.™ GoTo™ o FlowTain™ a la superficie lingual de cada diente.

- Coloque la cadena Ortho FlexTech® en el adhesivo aplicado ("capa base") en la superficie lingual. Busque la posición para una mejor alineación y elimine cualquier holgura de la cadena.

- Método alternativo: Coloque un extremo de la cadena Ortho FlexTech® en la pasta adhesiva aplicada ("capa base") en la superficie de la cúspide lingual. Busque la posición para una mejor alineación y fotopolimerice para mantener la cadena en su lugar. Proceda al siguiente diente y retire cualquier holgura de la cadena. Repita este proceso hasta alcanzar la cúspide opuesta.

4. Coloque una "capa" de L.C.R.™ GoTo™ o FlowTain™ por encima del material polimerizado para cubrir la cadena Ortho FlexTech™. Fotopolimerice la pasta de "la capa superior" en cada diente adherido.

5. Compruebe si hay interferencias entre la parte superior e inferior. Pula cuidadosamente cualquier punto duro o elevado.

NOTA: Si se usa en la parte superior para corregir un diastema, considere el uso de alambre trenzado de 0,0175 1 a 1 o Retainium™ como método secundario, ya que la cadena puede estirarse ligeramente y permitir que el espacio vuelva a abrirse.

② No debe reutilizarse. Este es un dispositivo de un solo uso

CÓDIGOS PARA NUEVOS PEDIDOS: REF# OFT2, Ortho FlexTech Oro de 30 pulg., REF# SSOFT, Ortho FlexTech Acero inoxidable de 30 pulg., REF# OFT, Ortho FlexTech Oro Grabado, de 30 pulg., REF# SSOFT, Ortho FlexTech Acero inoxidable Grabado.

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe. Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

FR FRENCH TRANSLATION

INDICATIONS D'UTILISATION : Destiné à être utilisé comme fil de contention linguale. Ce produit n'est pas indiqué pour les personnes sensibles au nickel.

MODE D'EMPLOI :

1. Procéder à la prophylaxie et au sablage de l'email, rincer et sécher. Mordancer l'email pendant 30 secondes. Rincer et sécher.
2. Appliquez une couche d'Assure® Plus sur l'email mordancé. Laisser légèrement sécher à l'air libre.
3. Appliquer une quantité minimale de L.C.R.™ GoTo™ ou FlowTain™ sur la surface linguale de chaque dent.
 - Placer la chaîne Ortho FlexTech® dans l'adhésif appliquée (« sous-couche ») sur la surface linguale. La positionner pour obtenir le meilleur alignement possible et éliminer tout relâchement de la chaîne.
 - Méthode alternative: Placer une extrémité de la chaîne Ortho FlexTech® dans la pâte adhésive appliquée (« sous-couche ») sur la surface de la cuspide linguale. La positionner pour obtenir le meilleur alignement possible, puis polymériser pour maintenir la chaîne en place. Passer à la dent suivante, en veillant à éliminer tout relâchement de la chaîne. Répéter ce processus jusqu'à ce que la cuspide opposée soit atteinte.
4. Placez une « surcouche » de pâte L.C.R. GoTo™ or FlowTain™ sur le matériau durci pour couvrir la chaîne Ortho FlexTech™. Photopolymériser la pâte de « surcouche » sur chaque dent liée.
5. Vérifier qu'il n'existe pas d'interférence entre le haut et le bas. Polir avec soin les saillies et points rugueux.

REMARQUE : En cas d'utilisation sur la partie supérieure pour maintenir le diastème, il faut envisager une torsion secondaire de 0,0175 de 1 à 1 ou du Retainium™, car la chaîne peut s'étirer légèrement, ce qui peut entraîner une réouverture de l'espace.

② Ne pas réutiliser. Il s'agit d'un dispositif à usage unique

LES RÉFÉRENCES POUR TOUTE NOUVELLE COMMANDE : REF# OFT2, Ortho FlexTech Or 30°, REF# SSOFT, Ortho FlexTech Acier 30°, REF# OFT, Ortho FlexTech Or mordancé, 30°, REF# SSOFT, Ortho FlexTech Acier mordancé.

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît sa responsabilité de remplacer les produits s'il est prouvé qu'ils sont défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

HR CROATIAN TRANSLATION

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Koristi se kao lingvalna žica za fiksaciju. Ovaj proizvod nije indiciran za osobe osjetljive na nikal.

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Profilirajte, provedite pjescarenje cakline, isperite i osušite. Provedite jetkanje cakline u trajanju od 30 sekundi. Isperite i osušite.
2. Nanesite jedan sloj proizvoda Assure® Plus na jetkanu caklinu. Lagano osušite zrakom.
3. Nanesite minimalnu količinu smjese LCR™ GoTo™ ili FlowTain™ na lingvalnu površinu svakog zuba.
 - Postavite lanac Ortho FlexTech® u naneseni adheziv („podloga“) na lingvalnoj površini. Posicionirajte da postignete najbolje poravnanje i popravite eventualnu labavost lanca.
 - Alternativna metoda: Postavite jedan kraj lanca Ortho FlexTech ® na nanesenu adhezivnu pastu („podloga“) na lingvalnoj strani očnjaka. Posicionirajte da postignete najbolje poravnanje i izvršite svjetlosno učvršćivanje da pričvrstite lanac. Predite na sljedeći zub, te popravite eventualnu labavost lanca. Ponavljajte ovaj postupak dok ne dodete do suprotnog očnjaka.
4. Postavite „presvlaku“ od paste LCR™ GoTo™ ili FlowTain™ na vrh učvršćenog materijala da prekrijete lanac Ortho FlexTech™. Tretirajte „presvlaku“ svjetlošću za učvršćivanje na svakom vezanom zubu.
5. Provjerite ima li smetnji između gornjih i donjih zubi. Ispolirajte sve grube tачke ili visoke vrhove pažljivo.

NAPOMENA: Ako se koristi na gornjim Zubima za držanje dijasteme, razmotrite primjenu sekundarnog uvrštanja od 0,0175 1 do 1 ili proizvoda Retainium™, jer se lanac može donekle rastegnuti što omogućuje ponovno otvaranje prostora.

② Nemojte ponovno koristiti. Ovo je uređaj za jednokratnu upotrebu

BROJEVI ZA NARUDŽBU: REF br. OFT2, Ortho FlexTech zlato 30°, REF br. SSOFT, Ortho FlexTech nehrđajući čelik 30°, REF br. OFT, Ortho FlexTech zlato jetkovano, 30°, REF br. SSOFT, Ortho FlexTech nehrđajući čelik jetkovani.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaza da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili posljedičan, koji proizlazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

HU HUNGARIAN TRANSLATION

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A rendszer linguális retenciós ívként történő felhasználásra szolgál. Ez a termék nikkelre érzékeny személyek számára nem javallt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Polírozza és homokfúvassa a zománcot, öblítse le és szárítsa meg. Savazza a zománcot 30 másodpercig. Öblítse le és szárítsa meg.
2. Vigyen fel egy réteg Assure® Plust a savazott zománcre. Szárítsa enyhe levegőárammal.
3. Vigyen fel minimális mennyiséggű L.C.R.™, GoTo™ vagy FlowTain™készítményt minden fog linguális felületére.
 - Helyezze az Ortho FlexTech® láncot a felhordott adhezívbe („alapozás”) a linguális felületre. Helyezze el a legjobb beállításba, és vegye figyelembe a lánc esetleges megereszkedését.
 - Alternatív módszer: Helyezze az Ortho FlexTech® lánc egyik végét az alkalmazott ragasztópasztába („aljbevonat”) a szemfog linguális felszínére. Illessz a lehető legpontosabban, és fotopolimerizálja, hogy a lánc a helyén maradjon. Folytassa a következő foggal, és korrigálja a lánc megereszkedéseit. Ismételje ezt az eljárást mindaddig, míg a szemben lévő szemfoghoz nem ér.
4. Helyezzen egy L.C.R.™ GoTo™ vagy FlowTain™ paszta „bevonatot” a megkéményedett anyag tetejére, hogy befedje az Ortho FlexTech™ láncot. Fotopolimerizálja a „fedő” paszttát minden egyes bondozzott fogon.
5. Ellenőrizze, hogy a felső és az alsó fogak nem zavarják-e egymást. Az esetleges durva területeket vagy kiemelkedő pontokat gondosan csiszolja le.

MEGJEGYZÉS: Ha a felső fogsonor diasztema tartására használják, akkor fontolja meg a másodlagos 0,0175 csavart 1: 1 vagy a Retainium™ elemet, mivel a lánc kissé nyújtható, lehetővé téve a tér újbóli megnyitását.

(2) Nem használható újra. Egyszer használatos eszköz

UTÁNRENDELÉSI SZÁMOK: REF# OFT2, Ortho FlexTech arany 30”, REF# SSOFT, Ortho FlexTech rozsdamentes acél 30”, REF# OFT, Ortho FlexTech arany maratott, 30”, REF# SSOFTE, Ortho FlexTech maratott rozsdamentes acél.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. elismeri, hogy felelős a termékeket kicserélni, ha azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségektől.

amely a termékek fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésszerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden kockázat és felelősséggel a felhasználót terhel.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárlag fogászati rendelvénnyre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

IT ITALIAN TRANSLATION

INDICAZIONI PER L'USO Concepito per essere utilizzato come filo per retainer linguale. Questo prodotto non è indicato per gli individui sensibili al nichel.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Eseguire la profilassi e sabbiare lo smalto, risciacquare e asciugare. Mordenzare lo smalto per 30 secondi. Risciacquare e asciugare.
2. Applicare uno strato di Assure® Plus sullo smalto mordenzato. Asciugare leggermente con aria.
3. Applicare una quantità minima di L.C.R.™ GoTo™ o FlowTain™ sulla superficie linguale di ogni dente.
 - Collegare la catenella Ortho FlexTech® sulla pasta adesiva applicata (strato sottostante, “undercoat”) sulla superficie linguale. Posizionare per il miglior allineamento possibile e correggere qualsiasi allentamento nella catenella.
 - Metodo alternativo: Inserire un'estremità della catenella Ortho FlexTech® nella pasta adesiva applicata (strato sottostante “undercoat”) sulla superficie della cuspide linguale. Posizionare per il miglior allineamento e fotopolimerizzazione per mantenere la catenella in posizione. Procedere fino al dente successivo, correggendo l'eventuale allentamento della catenella. Ripetere questo processo fino a raggiungere la cuspide opposta.
4. Collegare uno strato di copertura (“overcoat”) di pasta L.C.R.™ GoTo™ o FlowTain™ sulla superficie superiore del materiale polimerizzato per coprire la catenella Ortho FlexTech™. Fotopolimerizzare la pasta “overcoat” su ogni dente incollato.
5. Verificare che non vi siano interferenze tra il superiore e l'inferiore. Levigare accuratamente qualsiasi punto ruvido o rilievo.

NOTA: Se usato sul superiore per trattenerne il diastema prendere in considerazione un twist 1-1 da 0,0175 secondario o Retainium™, dato che la catenella può distendersi leggermente permettendo allo spazio di riaprirsi.

(2) Non riutilizzare. Questo è un dispositivo monouso

NUMERI PER IL RIORDINO: RIF# OFT2, Ortho FlexTech oro 30", RIF# SSOFT, Ortho FlexTech acciaio inossidabile 30", RIF# OFT, Ortho FlexTech oro mordenzato, 30", RIF# SSOFTE, Ortho FlexTech acciaio inossidabile mordenzato.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. riconosce la propria responsabilità di sostituire i prodotti se si dimostra che sono difettosi. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NL DUTCH TRANSLATION

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Bedoeld voor gebruik als linguale retentiedraad. Dit product is niet bedoeld voor personen die gevoelig zijn voor nikkel.

GEbruiksaanwijzing:

1. Reinig en zandstraal het glazuur, spoel en droog. Ets het glazuur gedurende 30 seconden. Spoel en droog.
2. Breng een laagje Assure® Plus aan op het geëtste glazuur. Licht droogblazen.
3. Breng een minimale hoeveelheid L.C.R.™ GoTo™ of FlowTain™ aan op het linguale oppervlak van elke tand.
 - Plaats de Ortho FlexTech®-ketting in de aangebrachte lijm ("onderlaag") op het linguale oppervlak. Positioneer voor de beste uitlijning en neem eventuele speling in de ketting weg.
 - Alternatieve methode: Plaats een uiteinde van de Ortho FlexTech®-ketting in de aangebrachte lijmpasta ("onderlaag") op het linguale hoektandoppervlak. Positioneer voor de beste uitlijning en hard uit met licht om de ketting op zijn plaats te houden. Ga door naar de volgende tand en neem eventuele speling in de ketting weg. Herhaal dit proces totdat de tegenovergestelde hoektand is bereikt.
4. Plaats een "bovenlaag" van L.C.R.™ GoTo™ of FlowTain™-pasta op het uitgeharde materiaal om de Ortho Flex Tech™-ketting te bedekken. De "bovenlaag"-pasta op elke gelijmde tand wordt licht uitgehard.
5. Controleer op interferentie tussen boven- en onderzijde. Polijst eventuele ruwe plekken of hoge punten zorgvuldig.

OPMERKING: Indien aan de bovenzijde gebruikt om het diasteem vast te houden, overweeg dan secundaire .0175 twist 1 tot 1 of Retainium™, omdat de ketting iets kan

uitrekken waardoor er weer ruimte is om te openen.

② Niet opnieuw gebruiken. Dit is een apparaat voor eenmalig gebruik

NABESTELNUMMERS: REF# OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF# SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", REF# OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", REF# SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

GARANTIE: Reliance Orthodontics Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

NO NORWEGIAN TRANSLATION

INDIKASJONER FOR BRUK: Tiltenk for bruk som en lingual retainervaijer. Dette produktet er ikke indikert for personer med ømfintlighet overfor nikkel.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

1. Forbehandle og sandblås emaljen, skyll og tørk. Ets emaljen i 30 sekunder. Skyll og tørk.
2. Páfør ett strøk Assure® Plus på den etsede emaljen. Tørk lett med luft.
3. Páfør en minimal mengde L.C.R.™ GoTo™ eller FlowTain™ på den linguale overflaten på hver tann.
 - Plasser Ortho FlexTech® -kjeden i det páførte adhesivet («undercoat») på den linguale overflaten. Posisjoner for best mulig innretting og ta opp eventuell slakk i kjeden.
 - Alternativ metode: Plasser den ene enden av Ortho FlexTech® -kjeden i den páførte adhesivpastaa («undercoat») på den linguale overflaten. Posisjoner for best mulig innretting, og lysherd for å holde kjeden på plass. Fortsett til neste tann, og ta opp eventuell slakk i kjeden. Gjenta denne prosessen til motstående kuspид er nådd.
4. Plasser en «overcoat» med L.C.R.™ GoTo™ eller FlowTain™ -pasta oppå det herdede materialet for å dekke Ortho FlexTech™ -kjeden. Lysherd «overcoat»-pastaa på hver bondede tann.
5. Kontroller for interferens mellom øvre og nedre. Polér eventuelle grove eller høyere

punkter nøye.

MERK: Hvis brukt på øvre for å holde et diastem, bør du vurdere en sekundær 0,0075 tvinning 1 til 1 eller Retainium™, da kjeden kan strekke seg noe før å gi plass til åpning igjen.

② Skal ikke gjenbrukes. Dette er en enhet for engangsbruk

NY BESTILLING: REF nr. OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", REF nr. SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", REF nr. OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", REF nr. SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

GARANTI: Reliance Orthodontics Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

PL POLISH TRANSLATION

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Przeznaczony do użytku jako retainer językowy. Ten produkt nie jest wskazany dla osób z wrażliwością na nikiel.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

- Przygotować i wypiąkać szkliwo, spłukać i wysuszyć. Wytrawiać szkliwo przez 30 sekund. Spłukać i osuszyć.
- Nałożyć jedną warstwę żywicy Assure® Plus na wytrawione szkliwo. Lekko osuszyć powietrzem.
- Nałożyć minimalną ilość materiału L.C.R.™ GoTo™ lub FlowTain™ na powierzchnię językową każdego zęba.
 - Umieścić łańcuszek Ortho FlexTech® w nałożonym kleju („podkładce”) na powierzchni językowej. Optymalnie wyrównać ustawienie i naciągnąć łańcuszek.
 - Metoda alternatywna: Jeden koniec łańcuszka Ortho FlexTech® umieścić w nałożonym kleju („podkładka”) na językowej powierzchni guzików. Optymalnie ustawić i utwardzić światłem, aby umocować łańcuszek na miejscu. Przejść do nastepnego zęba, naciągając łańcuszek. Powtarzać ten proces aż do osiągnięcia przeciwnego guzka.
- Na utwardzony materiał nałożyć warstwę pasty L.C.R.™, GoTo™ lub FlowTain™, aby pokryć łańcuszek Ortho FlexTech™. Utwierdzić światłem wierzchnią warstwą pasty

na każdym klejonym zębie.

- Sprawdzić, czy nie występują zakłócenia i kolizje między zębami górnymi a dolnymi. Ostrożnie wypolerować szorstkie miejsca i nierówności.

UWAGA: W przypadku stosowania na zębach górnych w związku z diastemą rozważać drugi skręt 0,0175 od 1 do 1 lub Retainium™, ponieważ łańcuszek może się łatwo rozciągnąć, pozwalając na ponowne otwarcie diastemy.

- Nie używać ponownie. To jest wyrób jednorazowego użytku.

ZAMAWIANIE: Kod kat.: OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", Kod kat.: SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", Kod kat.: OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", Kod kat.: SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymiane produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPCJI: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

PT PORTUGUESE TRANSLATION

INDICAÇÕES DE USO: Destinado a ser usado como um fio retentor lingual. Este produto não é indicado para indivíduos com sensibilidade ao níquel.

INSTRUÇÕES DE USO:

- Faça a profilaxia e aplique jato de areia no esmalte, enxágue e seque. Condicione o esmalte durante 30 segundos. Enxágue e seque.
- Aplique uma camada de Assure® Plus no esmalte condicionado. Seque ligeiramente ao ar.
- Aplique uma quantidade mínima de L.C.R.™ GoTo™ ou FlowTain™ na superfície lingual de cada dente.
 - Coloque a corrente Ortho FlexTech® no adesivo aplicado (“subcamada”) na superfície lingual. Posicione para o melhor alinhamento e elimine qualquer folga na corrente.
 - Método alternativo: Coloque uma extremidade da cadeia Ortho FlexTech® na pasta adesiva aplicada (“subcamada”) sobre a superfície cúspide lingual. Posicione para melhor alinhamento e faça a fotopolimerização para manter a

corrente no lugar. Avance para o próximo dente, eliminando qualquer folga na corrente. Repita este processo até que a cúspide oposta tenha sido alcançada.

4. Coloque uma "subcamada" de pasta L.C.R.™ GoTo™ ou FlowTain™ em cima do material curado para cobrir a corrente Ortho FlexTech™. Faça a fotopolimerização da pasta "subcamada" em cada dente colado.
5. Verifique se há interferência entre a parte superior e inferior. Faça o polimento cuidadosamente de quaisquer pontos ásperos ou pontos altos.

NOTA: Se usado na parte superior para manter a diastema, considere o secundário 0,0175 twist 1 a 1 ou Retainium™, pois a corrente pode esticar-se ligeiramente permitindo a reabertura de espaço.

② Não reutilize. Este é um dispositivo de uso único

NÚMEROS PARA NOVO PEDIDO: REF# OFT2, Ouro 30" Ortho FlexTech, REF# SSOFT, Aço inoxidável 30 "Ortho FlexTech, REF# OFT, Ouro Condicionado 30" Ortho FlexTech, REF# SSOFTE, Aço inoxidável condicionado Ortho FlexTech.

GARANTIA: A Reliance Orthodontics Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação a isso.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

RO ROMANIAN TRANSLATION

INDICAȚII DE UTILIZARE: destinat pentru a fi utilizat ca sărmă de retenție linguală. Acest produs nu este indicat persoanelor cu sensibilitate la nichel.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

1. Profilați și sablați smalțul, clătiți și uscați. Gravați smalțul timp de 30 de secunde. Clătiți și uscați.
2. Aplicați un strat de Assure® Plus pe smalțul gravat. Uscați ușor cu aer.
3. Aplicați o cantitate minimă de L.C.R.™ GoTo™ sau FlowTain™ pe suprafața linguală a fiecărui dintă.
 - Plasați lanțul Ortho FlexTech® în adezivul aplicat („substrat”) pe suprafața linguală. Poziționați astfel încât să obțineți cea mai bună aliniere și tensionați lanțul.

- Metodă alternativă: plasați un capăt al lanțului Ortho FlexTech® în pasta adezivă aplicată („substrat”) pe suprafața linguală a cuspidului. Poziționați astfel încât să obțineți cea mai bună aliniere și fotopolimerizați pentru a fixa lanțul. Treceți la următorul dintă, tensionând lanțul. Repetați acest proces până când ajungeți la cuspidul opus.

4. Plasați o un strat de pastă L.C.R.™ GoTo™ sau FlowTain™ deasupra materialului polimerizat pentru a acoperi lanțul Ortho FlexTech™. Fotopolimerizați pasta de „acoperire” pe fiecare dintă lipit.
5. Verificați dacă există interferențe între partea superioară și cea inferioară. Lustruiți cu atenție orice puncte dure sau puncte înalte.

NOTĂ: dacă este folosit pe partea superioară pentru a menține diastema, luateți în considerare o răsucire de .0175 secundară, raport 1 la 1 sau Retainium™, deoarece lanțul se poate întinde ușor, permitând redeschiderea spațiului.

② Nu reutilizați. Acesta este un dispozitiv unică folosință

NUMERE DE COMANDARE ULTERIOARĂ: NR. REF. OFT2, Ortho FlexTech Aur 30", NR. REF. SSOFT, Ortho FlexTech otel inoxidabil 30", NR. REF. OFT, Ortho FlexTech aur gravat, 30", REF# NR. REF. SSOFTE, Ortho FlexTech otel inoxidabil gravat.

GARANȚIE: Reliance Orthodontics Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitățea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderea în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPTIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

SV SWEDISH TRANSLATION

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: Avsedd för användning som lingual retainertråd. Produkten är inte avsedd för behandling av personer som är känsliga för nickel.

BRUKSANVISNING:

1. Polera och sandblästra emaljen, skölj och torka. Etsa emaljen i 30 sekunder. Skölj och torka.
2. Applicera ett lager Assure ® Plus på den etsade emaljen. Torka lätt med luft.
3. Applicera en minimal mängd LCR™ GoTo™ eller FlowTain™ på den linguala ytan på varje tand.

- Placera Ortho FlexTech ®-kedjan i applicerad adhesiv ("undercoat") på den linguala ytan. Positionera för bästa inriktning och strama åt.
 - Alternativ metod: Placera den ena änden av Ortho FlexTech ®-kedjan i den applicerade adhesivpastan ("undercoat") på den linguala kuspidyan. Positionera för bästa inriktning och ljusthärdta för att hålla kedjan på plats. Fortsätt till nästa tand och strama åt. Upprepa denna process tills motsatt kuspid har nåtts.
4. Applicera ett lager LCR™ GoTo™- eller FlowTain™-pasta ovanpå det härdade materialet för att täcka Ortho FlexTech ®-kedjan. Ljushärdta pastan på varje bondad tand.
5. Kontrollera interferens mellan övre och under. Polera försiktigt grova fläckar och utstickande spetsar.

OBS! Om du använder den övre för att hålla diastema, överväg sekundär .0175 vridning 1:1 eller Retainium™, eftersom kedjan kan sträcka sig något så att utrymmet öppnas igen.

② Får ej återanvändas. Endast avsett för engångsbruk

BESTÄLLNINGSKODER: best.kod: OFT2, Ortho FlexTech Gold 30", best.kod: SSOFT, Ortho FlexTech Stainless Steel 30", best.kod: OFT, Ortho FlexTech Gold Etched, 30", best.kod: SSOFTE, Ortho FlexTech Stainless Steel Etched.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. åtar sig ansvarat att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av felaktig eller oaktksam användning. Före användning ansvarar användaren för att fastställa huruvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får denna enhet endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.



■ Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Ave. Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

**AUSTRALIAN SPONSOR,
EMERGO AUSTRALIA,**

Level 20, Tower II,
Darling Park,
201 Sussex St, Sydney,
NSW 2000, Australia

EC REP

EMERGO EUROPE,
Prinsessgracht 20,
2514 AP The Hague,
The Netherlands

MD

Check out our new learning platform Reliance U!
www.RelianceU.tech

Scan for more
information

